

Inserto

Sopaldine®

**Insaponificable de Aceite de Palta (*Persea gratissima*) 100 mg +
Insaponificable de Aceite de Soya (*Glycine max*) 200 mg
Cápsula Blanda**

COMPOSICIÓN:

Cada Cápsula blanda contiene:

Insaponificable de Aceite de Palta	100 mg
(<i>Persea gratissima</i>)	
Insaponificable de Aceite de Soya	200 mg
(<i>Glycine max</i>)	
Excipientes	c.s.p.

Lista de excipientes:

Vitamina E acetato, Aceite de maíz refinado, Hidroxianisol butilado, Hidroxitolueno butilado, Metilparabeno, Propilparabeno, Aceite vegetal hidrogenado, Cera blanca de abeja, Cápsula blanda (Gelatina, Glicerina, Metilparabeno, Propilparabeno, Ponceau 4R Supra, Sorbitol 70%, Dióxido de titanio, Azul brillante y Agua purificada).

1. USO RECOMENDADO:

Coadyuvante en el tratamiento de la osteoartritis y periodontitis.

2. DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Vía de administración: Oral.

Dosis: La dosis recomendada de Sopaldine® para adultos es una cápsula al día, preferiblemente con las comidas. Este producto puede tomarse de 3 a 6 meses. Consulte a su médico.

3. CONTRAINDICACIONES:

Historial de hipersensibilidad a la soya o a cualquiera de los componentes del producto.

Contiene Soya: No tomar si tiene una alergia conocida a las preparaciones que contienen soya.

No tomar durante el embarazo y la lactancia. Las personas que sufren enfermedades cardiovasculares deben evitar su uso o consultar a un profesional de la salud antes de usar.

4. REACCIONES ADVERSAS:

- Regurgitaciones raras con olor a lípidos que pueden evitarse tomando la cápsula en el medio de las comidas.
- Raras reacciones de hipersensibilidad.
- Hipersensibilidad a la soya o cualquiera de los componentes del producto.
- Daño hepático excepcional con transaminasas elevadas, fosfatasa alcalina, bilirrubina y gamma GT.
- Trastornos gastrointestinales: diarrea y epigastralgia (frecuencia desconocida). Se identificaron también los siguientes efectos adversos: **náuseas y malestar estomacal.**

“Si se observa reacciones adversas interrumpir su uso. Consulte con su médico”.

5. INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS:

Para evitar interacciones, informe a su médico si está tomando otro producto.

6. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C. Proteger de la luz y la humedad.
- Conservar en su envase original.
- No utilice Sopaldine® después de la fecha de vencimiento (mes-año) que aparece en los rotulados. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

VENTA SIN RECETA MÉDICA

FABRICADO POR:

Myra Healthcare
India

PARA:

CAFERMA S.A.C.